

АЦИМИКС® **раствор для приема внутрь**

Описание

Прозрачная жидкость синего цвета.

Состав

1 л кормовой добавки содержит

действующие вещества: цинка ацетата - 10 г; меди сульфата - 10 г; кислоты муравьиной - 260 г; кислоты пропионовой - 100 г; кислоты молочной - 120 г;
вспомогательного вещества - воды очищенной - до 1 л.

Биологические свойства

Ацимикс® - смесь органических кислот и их солей, соединений цинка и меди, обеспечивающих антимикробное и противогрибковое действия подкислителя.

Подкислитель способствует оптимизации процессов пищеварения у свиней и домашней птицы, препятствует размножению грибков и бактерий (*Salmonella spp.*, *E. coli* и др.) в воде и кормах. Снижает рН питьевой воды, что позволяет поддерживать чистоту в системе водоснабжения (очищает от биопленки и препятствует ее появлению).

Применение

Подкислитель применяют для защиты питьевой воды от дрожжей, плесени, патогенных бактерий и для уничтожения биопленки в системах водоснабжения (в том числе после применения лекарств и вакцин с питьевой водой), для улучшения баланса микрофлоры пищеварительного тракта и предотвращения развития диареи у свиней и домашней птицы, для снижения рН содержимого пищеварительного тракта, для содействия эффективному усвоению питательных веществ, благодаря улучшению активности пищеварительных ферментов и аппетита.

Дозировка

Вводят перорально с питьевой водой (свиньям, курам-бройлерам, курам-несушкам) в дозах 1-2 л подкислителя на 1000 л питьевой воды. Этот раствор выпаивают в течение не менее 12 часов в сутки при дозировке 1 л подкислителя на 1000 л питьевой воды и в течение не менее 8:00 при дозировке 2 л подкислителя на 1000 л питьевой воды. Продолжительность выпойки составляет 5-10 суток.

Для очистки системы водоснабжения в водопровод заливают 1% раствор подкислителя (выдерживают не менее 12:00). После применения систему следует промыть проточной холодной водой. При очистке системы водоснабжения воду используют для выпойки животных.

Противопоказания

Нет.

Предостережение

Не использовать одновременно с лекарствами и вакцинами.

Препарат Ацимикс® раздражает глаза, дыхательную систему и кожу; опасен при проглатывании. В случае попадания препарата на кожу или в глаза их следует промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения. При ухудшении самочувствия необходимо немедленно обратиться к врачу (показать этикетку подкислителя).

Упаковка

Пластиковые канистры по 5 л.

Хранение

Темное, недоступное для детей место при температуре 0-30 °С.

Срок годности

2 года.

После разведения в воде - 24 часа.