

### **Вольвак® НХ Конц. КВ**

Вакцина инактивированная концентрированная против ньюкаслской болезни птицы из штамма Ла Сота.

Одна доза (0,2 см<sup>3</sup>) вакцины содержит:

Активно действующих веществ:

вирус ньюкаслской болезни, штамм Ла Сота, не менее 108.6 ЕИД<sub>50</sub>.

### **Показания к применению**

Вакцина предназначена для активной иммунизации клинически здоровой птицы начиная с суточного возраста против ньюкаслской болезни.

### **Способ применения и дозы**

Вакцину вводят подкожно в среднюю треть дорсальной области шеи в дозе 0,1 см<sup>3</sup> в расчете

на одну птицу (бройлеры) и в дозе 0,2 см<sup>3</sup> вакцины в расчете на одну птицу (куры-несушки и родительское поголовье птицы).

Схема вакцинации:

- Бройлеры - разовая вакцинация начиная с суточного возраста (возможна вакцинация в течение первых 10 суток).

- Куры-несушки и родительское поголовье птицы - разовая вакцинация в течение первых двух недель в случае необходимости проводят ревакцинацию в возрасте от 8 недель жизни птицы.

Подготовка вакцины. Для сохранения максимальной активности вакцины перед применением флакон с вакциной необходимо подогреть до комнатной температуры. Теперь вакцина готова к применению. Тщательно встряхнуть перед применением и в течение процедуры.

**РП: ВА-00516-02-12**