

МАСТИЛЕК® ФОРТЕ **суспензия для интрацистернально применения**

Описание

Суспензия желтого цвета.

Состав

10 мл препарата содержат:

действующие вещества: цефквинома (в пересчете на цефквинома сульфат) - 75 мг
преднизолона - 10 мг энрофлоксацина - 500 мг

Вспомогательные вещества: масло растительное, пропилпарагидроксибензоат, метилпарагидроксибензоат.

Фармакологические свойства

АТС vet QJ01 - антибактериальные ветеринарные препараты системного действия.
QJ01DE90 - цефквином.

Цефквином - цефалоспорин 4-й генерации, обладающий широким спектром антибактериального действия на большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Citrobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Serratia marcescens*, *Histophilus somni*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Bacillus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Prevotella spp.* и *Erysipelothrix rhusiopathiae*), в том числе штаммов, продуцирующих β-лактамазы. Механизм бактерицидного действия цефквиному заключается в подавлении синтеза клеточной мембраны микроорганизмов.

Энрофлоксацин - антибиотик широкого спектра действия, относится к группе фторхинолонов. Препарат эффективен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium spp.*, *Pseudomonas spp.*, *E. coli*, *Haemophilus spp.*, *Salmonella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Pasteurella spp.* и т.д.), а также микоплазм и хламидий. Механизм действия связан с угнетением бактериальной ДНК-гиразы, которое приводит к нарушению репликации ДНК бактерий.

Применение

Препарат применяют для лечения крупного рогатого скота при клинических и субклинических маститах в период лактации, вызванных микроорганизмами, чувствительными к составляющим препарата.

Дозировка

После тщательного выдаивания пораженных четвертей молочной железы в сосковый канал вводят содержимое одной шприц-тубы (10 мл), подогретой до температуры тела, 3 раза с интервалом 12:00.

Противопоказания

Запрещено применять препарат коровам с гиперчувствительностью к цефалоспорином и другим β-лактамным антибиотикам, в частности цефквиному. В случае появления аллергической реакции прекращают использовать препарат и проводят симптоматическую терапию. Следует избегать увеличения интервалов между приемами препарата, это может привести к снижению эффективности лечения.

Предостережение

Не рекомендуется применять препарат с другими антибактериальными средствами, которые обладают бактериостатическим действием.

Людам можно потреблять молоко через 4 суток, а забой животных на мясо разрешается через 2 суток после последнего введения препарата. Молоко и мясо, полученные до указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.

Упаковка

Пластиковые шприц-тубы по 10 мл, по 20 шт. в упаковке.

Хранение

В заводской упаковке, в сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре 2-30 ° С.

Срок годности

2 года.