

ЦЕБАКТАЛ®
(суспензия для инъекций)

Описание

Непрозрачная жидкость светло-желтого цвета.

Состав

1 мл препарата содержит действующее вещество:

цефквином (в пересчете на цефквинома сульфат) - 25 мг.

Вспомогательные вещества: масло растительное, пропилпарагидроксибензоат, метилпарагидроксибензоат.

Фармакологические свойства

АТСvet классификационный код QJ01, антибактериальные ветеринарные препараты системного действия (QJ01DE90, цефквином).

Цефквином - цефалоспорин 4-й генерации, обладает широким спектром антибактериального действия по отношению к большинству грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т.ч. *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Citrobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pasterella spp.*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Serratia marcescens*, *Histophilus somni*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Bacillus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Prevotella spp.* и *Erysipelothrix rhusiopathiae*, в т.ч. штаммы, продуцирующие β-лактамазы. Механизм бактерицидного действия цефквинома заключается в ингибирование синтеза клеточной мембраны бактерий.

Применение

Препарат применяют для лечения: крупного рогатого скота - при респираторных заболеваниях, вызванных *Pasteurella multocida* и *Pasteurella haemolytica*, межпальцевом дерматите бактериальной этиологии, некробактериозе и остром мастите, в т.ч. вызванном *Escherichia coli*, эшерихиозе (колибактериозе) телят; свиней - при респираторных заболеваниях, вызванных *Pasteurella multocida*, *Haemophilus parasuis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis*, синдроме ММА (мастит-метрит-агалактия), менингите, обусловленном *Streptococcus suis*, артрите, дерматите и других инфекциях бактериальной этиологии, обусловленных микрофлорой, чувствительной к цефквиному.

Дозировка

Препарат вводят глубоко внутримышечно раз в сутки в течение 2-5 суток в дозах, указанных в таблице.

Вид животных	Показания	Суточная доза препарата	Длительность применения
Крупный рогатый скот	Респираторные заболевания, межпальцевый некробактериоз или дерматит	2 мл на 50 кг м.т.	3-5 суток
	Острый мастит	2 мл на 50 кг м.т.	2 суток
	Эшерихиоз (колибактериоз) телят	4 мл на 50 кг м.т.	3-5 суток
Свиньи	Респираторные заболевания	4 мл на 50 кг м.т.	3 суток
	Синдром ММА	4 мл на 50 кг м.т.	2 суток
	Менингит, артрит, дерматит	4 мл на 50 кг м.т.	5 суток

Противопоказания

Не применять животным, чувствительным к препарату, а также к другим β -лактамным антибиотикам. Не применять одновременно с бактериостатическими препаратами.

Предостережение

Перед каждым использованием флакон с препаратом следует тщательно взболтать. С целью предотвращения локальной реакции в течение периода лечения рекомендуется менять места инъекции препарата. Следует избегать пропусков введения очередной дозы препарата, т.к. это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы ее следует ввести как можно быстрее, в дальнейшем интервал между приемами не меняется.

Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается через 8 суток, свиней - через 4 суток после последнего применения препарата. Молоко коров не разрешается использовать в пищу в период лечения препаратом, а также в течение 3 суток после последнего применения препарата. Такое молоко может быть использовано в корм непродуктивным животным после термической обработки. Полученное до указанного срока мясо утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.

Форма выпуска

Флаконы из стекла, закрытые резиновыми пробками под алюминиевую обкатку, по 50 и 100 мл.

Хранение

Препарат хранят в транспортной таре, в крытых складских помещениях в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 30° С. Срок годности - 2 года.