



Препараты фирмы Jordan Vet. & Agr. Med. Ind. Co. (JOVET)
(эксклюзивный дистрибьютор — ООО «АТ Биофарм»)

Доксициклин 20%
водорастворимый порошок

- Содержит доксициклина гидрохлорид
- Профилактика и лечение заболеваний органов дыхания и желудочно-кишечного тракта бактериальной этиологии у птицы и свиней
- Препарат имеет широкий спектр антимикробного действия относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий

Описание

Порошок светло-желтого цвета.

Состав

1 г препарата содержит действующее вещество:

доксициклина гидрохлорид – 200 мг.

Фармакологическое действие

Доксициклин – бактериостатичный антибиотик, который принадлежит к группе тетрациклинов. Действует на рибосомы бактерий, препятствуя белковому синтезу. Препарат имеет широкий спектр антимикробного действия относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Staphylococcus spp.*, *Diplococcus pneumonia*, *Streptococcus spp.*, *Haemophilus influenza.*, *E. coli*, *Pneumococci*, *Bacillus antracis*, *Clostridium tetani*, *Clostridium perfringes*, *Listeria monocytogens*, *Actinomyces spp.*, *Entirobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Salmonella spp.*, *Shigella*, *Yersinia spp.*), а также микоплазм, риккетсий и хламидий. После орального применения доксициклин быстро абсорбируется и достигает пиковой концентрации в крови через 3 ч., сохраняется в организме длительное время.

Применение

Профилактика и лечение заболеваний органов дыхания и желудочно-кишечного тракта бактериальной этиологии у птицы и свиней.

Дозирование

Перорально.

Птица:

- Лечение – 100 г на 200 л питьевой воды на протяжении 5-7 суток;
- Профилактика – 50 г на 200 л питьевой воды на протяжении 5 суток.

Свиньи:

- Лечение – 100 г на 100 л питьевой воды на протяжении 3-5 суток;
- Профилактика – 50 г на 100 л питьевой воды на протяжении 3-5 суток.

Противопоказание

Не применять животным, чувствительным к тетрациклинам, а также животным с заболеваниями почек и печени. Не применять курам-несушкам.

Предостережение

Забой животных на мясо разрешается через 4 суток после последнего применения препарата. До указанного срока мясо скармливают непродуктивным животным или утилизируют (в зависимости от вывода ветврача).

Форма выпуска

Пластиковые упаковки по 1000 г.

Хранение

Сухое, темное место при температуре от +15 до +30°C.

Срок годности – 3 года.