



Препараты фирмы Jordan Vet. & Agr. Med. Ind. Co. (JOVET)
(эксклюзивный дистрибьютор — ООО «АТ Биофарм»)

Колистин 6М
водорастворимый порошок

- Водорастворимый порошок, имеющий в своем составе колистина сульфат
- Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта бактериальной этиологии у телят, ягнят, поросят и птицы
- Препарат оказывает бактерицидное действие на грамотрицательные бактерии

Описание

Порошок белого цвета.

Состав

1 г препарата содержит действующее вещество:
колистина сульфат – 6 000 000 МЕ.

Фармакологическое действие

Колистин 6 М– антибиотик группы полимиксинов, которые синтезируются аэробной спорообразующей палочкой *Bacillus polymyxa*. Он бактерицидно действует на грамотрицательные бактерии (*E. coli*, *Haemophilus spp.*, *Salmonella spp.* и др.). Колистин 6М связывается с фосфолипидами цитоплазматической мембраны, усиливает ее проницаемость как для внутри- так и для внешнecклеточных компонентов, что ведет к деструкции клеток бактерии. Препарат всасывается из желудочно-кишечного тракта в маленьких дозах. Выводится из организма преимущественно фекалиями.

Применение

Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта бактериальной этиологии у телят, ягнят, поросят и птицы.

Дозирование

Перорально.

Телята, ягнята – 0,1 г препарата на 10 кг живой массы тела на день на протяжении 3-6 дней;

Птица – 100-200 г на 1000 л питьевой воды на протяжении 3-5 дней;

Поросята – 100 г на 500-700 л питьевой воды на протяжении 3-6 дней.

Противопоказания

Не применять животным, чувствительным к колистину, а также животным с заболеваниями почек. Не применять одновременно с другими противомикробными препаратами.

Предостережение

Забой животных на мясо разрешается через 3 дня после последнего применения препарата. До указанного срока мясо скормливают непродовольственным животным или утилизируют (в зависимости от вывода ветврача).

Форма выпуска

Пластиковые флаконы по 1000 г.

Хранение

Сухое, темное место при температуре от +15 до +30°C. Срок годности – 36 месяцев.